CAMZYOS® (Mavacamten) PATIENTENKARTE

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

Anweisungen für Patienten: Tragen Sie diese Karte zu jeder Zeit bei sich. Informieren Sie jeden Angehörigen der Heilberufe, der Sie behandelt, dass Sie CAMZYOS einnehmen.



Schwangere oder gebärfähige Frauen

CAMZYOS kann schädliche Auswirkungen auf ein ungeborenes Kind haben und ist daher während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine wirksame Empfängnisverhütung anwenden, kontraindiziert.

Frauen, die gebärfähig sind, müssen während der Behandlung mit CAMZYOS, auch bei Behandlungsunterbrechungen, und noch mindestens 6 Monate nach Beendigung der Behandlung mit CAMZYOS eine wirksame Methode zur Schwangerschaftsverhütung anwenden.

CAMZYOS wird zur Behandlung von symptomatischer hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie angewendet. Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor sie CAMZYOS anwenden. Den vollständigen und aktuellen Text der Packungsbeilage finden Sie unter www.afmps.be, Rubrik « Chercher des informations sur un médicament autorisé » -> Chercher -> CAMZYOS.

Weitere Informationen finden Sie im Patientenleitfaden oder auf der Website: www.camzyos-safety-patient.be.

Sie können sich auch an den medizinischen Informationsdienst von Bristol Myers Squibb wenden: Tel.: +32 2 352 76 11 E-mail: medicalinfo.belgium@bms.com.

Sicherheitsinformationen für gebärfähige Patientinnen

- CAMZYOS kann Ihr ungeborenes Kind schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.
- CAMZYOS darf nicht eingenommen werden, wenn Sie schwanger oder gebärfähig sind und keine zuverlässige Empfängnisverhütungsmethode anwenden.
- Wenn Sie schwanger werden können, müssen Sie während der Einnahme von CAMZYOS und für 6 Monate nach

- Einnahme Ihrer letzten Dosis eine zuverlässige Empfängnisverhütungsmethode anwenden.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie beabsichtigen, schwanger zu werden.
- Wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder wenn Sie schwanger sind, müssen Sie **unverzüglich** Ihren Arzt informieren.

Sicherheitsinformationen für alle Patienten:

- Informieren Sie **unverzüglich** Ihren Arzt oder nehmen Sie andere medizinische Hilfe in Anspruch, wenn bei Ihnen neue oder sich verschlechternde Symptome einer Herzinsuffizienz auftreten, einschließlich Kurzatmigkeit. Schmerzen im Brustkorb, Erschöpfung, Herzrasen (Herzklopfen) oder Anschwellen der Beine.
- Informieren Sie Ihren Arzt über alle neuen und vorbestehenden Erkrankungen.
- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker über Ihre Behandlung mit CAMZYOS, bevor Sie iegliche neue Arzneimittel (einschließlich verschreibungspflichtige und rezeptfrei erhältliche) oder pflanzliche Präparate einnehmen. Denn einige dieser Produkte können die Menge von CAMZYOS in Ihrem Körper erhöhen und das Auftreten von Nebenwirkungen (von denen einige schwer sein können) wahrscheinlicher machen. Beenden Sie nicht die Einnahme von Arzneimitteln oder pflanzlichen Präparaten, die Sie bereits einnehmen oder ändern Sie nicht deren Dosis, ohne vorher mit Ihrem Arzt oder Apotheker zu sprechen, da andere Arzneimittel die Wirkung von CAMZYOS beeinflussen können.

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie den Arzt, der Ihnen CAMZYOS verschreibt, ihn auszufüllen.

| Name des Patienten |
|--|
| Name des verschreibenden Arztes |
| Telefonnummer der Arztpraxis |
| Telefonnummer außerhalb der Öffnungszeiten |
| Name des Krankenhauses (falls zutreffend) |