CARTE PATIENTS

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.

Instructions destinées au patient : Conservez cette carte avec vous <u>de façon permanente</u>. Informez tout professionnel de santé que vous consultez que vous êtes traité(e) par CAMZYOS.



Femmes enceintes ou susceptibles de procréer

CAMZYOS peut avoir des effets nocifs sur un enfant à naître, et est donc contre-indiqué pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception efficace.

Les femmes susceptibles de procréer doivent utiliser une méthode efficace de prévention de grossesse durant le traitement par CAMZYOS, y compris en cas d'interruptions de traitement, et pendant encore au moins 6 mois après l'arrêt du traitement par CAMZYOS.

CAMZYOS est indiqué pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique.

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament CAMZYOS. Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « Chercher des informations sur un médicament autorisé » -> Chercher -> CAMZYOS

De plus amples informations sont disponibles dans le Guide Patients ou sur le site www.camzyos-safety-patient.be.

Vous pouvez également contacter le service d'information médicale de Bristol Myers Squibb : Tél : +32 2 352 76 11 E-mail: <u>medicalinfo.belgium@bms.com</u>

Informations relatives à la sécurité pour les patientes en âge de procréer :

- CAMZYOS peut être nocif pour le bébé à naître s'il est utilisé pendant la grossesse.
- CAMZYOS ne doit pas être pris si vous êtes enceinte ou si vous êtes en âge de procréer et si vous n'utilisez pas de méthode de contraception efficace.
- Si vous êtes susceptible de tomber enceinte, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant

toute la durée du traitement et pendant les 6 mois après votre dernière dose.

- Entretenez-vous avec votre médecin si vous prévoyez une grossesse.
- Si vous pensez être enceinte ou si vous êtes enceinte, informez immédiatement votre prescripteur ou votre médecin traitant.

Informations relatives à la sécurité pour tous les patients :

- Informez immédiatement votre prescripteur, votre médecin traitant ou tout autre professionnel de santé en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes d'insuffisance cardiaque, y compris un essoufflement, une douleur thoracique, de la fatigue, une accélération du rythme cardiaque (palpitations) ou un gonflement des jambes.
- Informez votre prescripteur ou votre médecin traitant de toute pathologie nouvelle ou existante.
- Informez votre prescripteur, votre médecin traitant ou votre pharmacien que vous êtes traité(e) par CAMZYOS avant de commencer à prendre tout nouveau médicament (y compris ceux délivrés sur ordonnance et les médicaments en vente libre) ou compléments alimentaires à base de plantes, car certains d'entre eux peuvent augmenter les quantités de CAMZYOS dans l'organisme et augmenter la probabilité pour vous de présenter des effets secondaires (potentiellement sévères). N'arrêtez pas de prendre tout médicament ou un complément alimentaire à base de plantes que vous prenez déjà et n'en modifiez pas la dose sans en parler au préalable à votre médecin ou à votre pharmacien, car d'autres médicaments peuvent influer sur le fonctionnement de CAMZYOS.

Veuillez compléter cette section ou demandez à votre prescripteur de CAMZYOS de le faire.

Nom du/de la patient(e)
Nom du prescripteur
Numéro de téléphone du cabinet/hôpital:
Numéro de téléphone en dehors des horaires de consultation
Nom de l'hônital (si applicable)